浅漬け野菜における 食中毒菌低減方法の開発

＜研究者＞宮 聡子

東京家政大学ヒューマンライフ支援機構
プロジェクト研究助成費

腸管出血性大腸菌による浅漬け食中毒事件例

発生年	発生地	原材料	血清型	患者数	死者数	参考文献
2000	埼玉	カブ	O157	7	3	Uehara, <i>et. al.</i> , 2000
2001	埼玉	和風キムチ	O157	29	0	尾関ら, 2003
2002	福岡	きゅうり	O157	100	0	小田ら, 2004
2011	栃木	なすと大葉	O157 & O145	20	0	内藤ら, 2012
2012	北海道	白菜	O157	107	5	Tabuchi, <i>et. al.</i> , 2015
2014	静岡	きゅうり	O157	510	0	浅沼ら, 2015

浅漬けの食中毒を予防する策が急務である

滅菌ニラ液の作成方法

根元10cmを使用

- ・ 食用に適さない根元部分を使用。
- ・ 予備実験で根元、中間、葉先で同様の静菌効果が得られることを確認済

ミキサーで
細断

- ・ ニラと等量の希釈液を加え、ミキサーで混和
- ・ 希釈液は培地での実験ではPBS、浅漬けでの実験では蒸留水を使用

遠心分離

- ・ 15,000rpm、10min

上清を
フィルター滅菌

- ・ 0.45 μ m、0.22 μ mのフィルターで2段階滅菌

培地におけるニラ液の静菌効果

供試菌株：*Escherichia coli* IAM1264, NBRC102203

寒天培地(Tryptic Soy Agar)

<方法>

<結果>

菌株	菌数 (CFU)			
	ニラ液濃度			
	0%	10%	25%	50%
IAM 1264	1.2E+04	0	0	0
NBRC 102203	1.3E+04	0	0	0

液体培地(Tryptic Soy Broth)

<方法>

10°C最大7日間
or
35°C最大6時間
培養

<結果>

白菜浅漬けにおけるニラ液の静菌効果

<方法>

<結果>

一般生菌数

大腸菌群数

0ml 1ml 5ml 10ml

- ◆寒天培地および液体培地において、ニラ液10%以上添加で *E. coli* に対する静菌効果が確認できた。
- ◆白菜の浅漬けにおいて、10℃および25℃培養でニラ液の *E. coli* に対する静菌効果が確認できた。
- ◆野菜の抽出液のみで *E. coli* の増殖が抑制できるため、消費者に受け入れられやすい手法であると考えられる。
- ◆今後は、10℃保存における一般生菌数の増殖抑制や、静菌のみならず殺菌ができる手法の開発を行う予定である。